



odborná společnost

PODPORA PŘI OČKOVÁNÍ

Homeopatické léky podáváme při očkování ke zmírnění možných nežádoucích reakcí po očkovacích látkách a také na podporu imunitního systému. Ten tak získá dostatečný prostor pro vytvoření optimální imunitní reakce. Naše zkušenosti potvrzují významně menší počet lokálních i celkových reakcí při podávání homeopatických léků po očkování. Tyto léky nemají kontraindikace, ani lékové interakce, mohou se kombinovat s jinými přípravky.

Thuya occidentalis 9 C

základní lék při každém očkování

5 granulí 1x denně
po dobu 10 dní ode dne očkování

+

Phosphorus 9 C

při očkování proti žloutence, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě typu B a onemocněním, jejichž původcem je Haemophilus influenzae B (hexavakcína)

5 granulí 1x denně
po dobu 10 dní ode dne očkování

nebo

Silicea 9 C

při očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím, při očkování proti tuberkulóze a dále u dětí s opakovanými ORL potížemi v anamnéze

5 granulí 1x denně
po dobu 10 dní ode dne očkování

Pokud se vyskytne přece jen reakce po očkování, postupujte následovně:

1. Kožní vyrážka a zvýšená tělesná teplota (do 38 °C): nasazujeme lék **BELLADONNA 9 C**
5 granulí ve třech dávkách po půl hodině, následně podle potřeby 3-5x denně do odeznění potíží.
2. Pokud je tělesná teplota po očkování více než 38 °C, je třeba symptomaticky snižovat horečku běžnými léky, nejčastěji s obsahem paracetamolu.
3. V případě závažnějších komplikací je prioritou postupovat adekvátně klinické situaci.

Uvedená dávkování vycházejí z klinické praxe, jde o dávkování převážně v praxi doporučovaná.